



SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI
aggiornamento ai Disciplinari di produzione integrata 2022
DIFESA COLTURE FRUTTICOLE e VITE

Coltura	Avversità	Sostanza attiva da inserire	Limitazioni d'uso
Actinidia	Cocciniglie, metcalfa e cimice asiatica	Sali potassici di acidi grassi	-
Albicocco, pesco, susino e ciliegio	Cimice asiatica	Sali potassici di acidi grassi	-
Albicocco	Oidio	Ciflufenamid	2 interventi all'anno
Fragola unifera e rifiorante	Afidi	Sulfoxaflor	1 intervento all'anno
Fragola unifera e rifiorante	Drosophila suzuki	Deltametrina	Nei limiti dei piretroidi
Fragola	Oidio	Ciflufenamid	2 interventi all'anno
Lampone e rovo da mora	Afidi e acari	Sali potassici di acidi grassi	-
Lampone, rovo da mora, ribes, uva spina e fragola	Oidio e botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	-
Melo, pero e olivo	Mosca mediterranea della frutta	Lambda-cialotrina (trappola attract & kill)	-
Melo e pero	Cimice asiatica	Tebufenozide	Nei limiti del gruppo Irac 18

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Coltura	Avversità	Sostanza attiva da inserire	Limitazioni d'uso
Melo e pero	Cimice asiatica	Sali potassici di acidi grassi	-
Melo e pero	Marciumi dei frutti	Pirimetanil	Nei limiti dei fungicidi anilino-pirimidine sulla coltura
Pero	Tentredine	Flupyradifurone	Da impiegare in post-fioritura e ad anni alterni
Pero	Maculatura bruna	Dodina	2 interventi all'anno sulla coltura
Pesco	Oidio	Ciflufenamid	2 interventi all'anno
Mirtillo, ribes e uva spina	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	-
Mirtillo	Botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	-
Nocciolo e noce	Cocciniglie e acari	Sali potassici di acidi grassi	-
Olivo	Cocciniglie	Sali potassici di acidi grassi	-
Olivo	Mosca delle olive	Flupyradifurone	1 intervento all'anno
Vite da vino e da uva da tavola	Cicalina verde e scafoideo	Sulfoxaflor	1 intervento all'anno
Vite da vino e da uva da tavola	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	-
Vite da vino e da uva da tavola	Oidio	Bacillus amyloliquefaciens	-
Vite da vino e da uva da tavola	Peronospora e botrite	Laminarina	-
Vite da vino	Marciume nero	Ditianon	Nei limiti della sostanza sulla coltura

DIFESA ORTICOLE

Coltura	Avversità	Sostanza attiva da inserire	Limitazioni d'uso
Aglio, basilico, cipolla, melanzana, pomodoro da industria e da mensa, porro, zucchino	Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	-
Asparago, bietola rossa (serra), bietola da coste o da foglia, cardo, carota, cavolo rapa, cavoli a foglia (serra), cece, finocchio, patata, spinacio	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	-
Basilico	Marciumi molli	Eugenolo+geraniolo+timolo	-
Bietola rossa	Pithium spp.	Trichoderma atroviride	-
Cavoli ad infiorescenza	Afidi	Flupyradifurone	1 intervento ogni 2 anni se è precoce, fino all'inizio della formazione della testa (100 ml/hl); 1 intervento all'anno se tardivo (60 ml/hl)
Cetriolo, cocomero, melone, zucca, zucchino, pomodoro da industria e luppolo	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	-
Cicoria, indivia riccia e scarola, lattuga	Marciume basale e del colletto	Trichoderma atroviride	-
Cicoria, indivia/scarola e radicchio	Oidio e marciume basale	Eugenolo+geraniolo+timolo	-
Cicoria, indivia/scarola, radicchio, bietola da coste e da foglia	Peronospora	Laminarina	-

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Coltura	Avversità	Sostanza attiva da inserire	Limitazioni d'uso
Fagiolino, luppolo,	Afidi e acari	Sali potassici di acidi grassi	-
Fagiolo, radicchio	Afidi, tripidi e acari	Sali potassici di acidi grassi	-
Finocchio, cavolo a foglia, a infiorescenza e a testa	Sclerotinia	Eugenolo+geraniolo+timolo	-
Lattuga	Marciume basale	Eugenolo+geraniolo+timolo	-
Melanzana, peperone e pomodoro da mensa	Oidio e botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	-
Patata	Rizottoniosi	Trichoderma atroviride	-
Patata	Dorifora e afidi	Flupyradifurone	1 intervento all'anno
Peperone in serra	Acari	Pyridaben	1 intervento all'anno
Peperone	Alternariosi	Bacillus amyloliquefaciens	
Pisello	Afidi	Flupyradifurone	1 intervento ogni 2 anni se è precoce, dall'emissione delle prime foglie; 1 intervento all'anno se tardivo, a partire dall'allungamento dello stelo fino a pre-raccolta
Pomodoro da industria	Alternariosi	Bacillus amyloliquefaciens	
Prezzemolo	Oidio e sclerotinia	Eugenolo+geraniolo+timolo	-
Radicchio	Cercosporiosi	Fluxapyroxad + difenoconazolo	nei limiti previsti per la miscela sulla coltura

Coltura	Avversità	Sostanza attiva da inserire	Limitazioni d'uso
Sedano	Afidi, tripidi	Sali potassici di acidi grassi	-
Spinacio	-	Spinetoram	Escluso dalla coltura
Spinacio	Peronospora	Laminarina	-

DIFESA SEMINATIVI

Coltura	Avversità	Sostanza attiva da inserire	Limitazioni d'uso
Frumento	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	-
Frumento	Oidio e septoriosi	Laminarina	-
Frumento	Septoriosi	Folpet	1 intervento all'anno senza oltrepassare lo stadio di foglia a bandiera
Orzo	Septoriosi ed elmintosporiosi	Laminarina	-
Soia	Acari	Sali potassici di acidi grassi	-

DISERBO FRUTTICOLE e VITE

Coltura	Avversità	Sostanza attiva da inserire	Limitazioni d'uso
Actinidia, albicocco, ciliegio, pesco, susino, melo, pero, nocciolo, vite da vino e da tavola	Diserbo graminacee e dicotiledoni impianti in allevamento e produzione	Acido Pelargonico	Assicurarsi che il prodotto non colpisca le parti verdi e non lignificate della coltura e nel caso usare schermature/campane
Actinidia, melo, pero, nocciolo, susino, lampone	Spollonante	Acido Pelargonico	-

Coltura	Avversità	Sostanza attiva da inserire	Limitazioni d'uso
Albicocco, ciliegio pesco, susino, pero	Diserbo post emergenza dicotiledoni impianti in allevamento e produzione	Fluroxipyr	-
Vite da vino e da tavola	Diserbo post emergenza dicotiledoni impianti in allevamento e produzione	MCPA	-

DISERBO ORTICOLE

Coltura	Avversità	Sostanza attiva da inserire	Limitazioni d'uso
Tutte le colture	Diserbo graminacee e dicotiledoni letti semina e pre trapianto	Acido Pelargonico	-
Cipolla	Diserbo dicotiledoni	Fluroxipyr	-

DISERBO SEMINATIVI

Coltura	Avversità	Sostanza attiva da inserire	Limitazioni d'uso
Tutte le colture	Diserbo graminacee e dicotiledoni letti semina e pre trapianto	Acido Pelargonico	-